

331 Colirrojo tizón



Colirrojo tizón. Verano. Adulto. Macho (09-VII).

COLIRROJO TIZÓN (*Phoenicurus ochruros*)

IDENTIFICACIÓN

13-15 cm. **Macho** adulto negro en verano, gris negruzco en invierno, con mancha blanca en las alas. **Hembra, juvenil** y algunos **machos** de segundo año de color pardo grisáceo. En todos los plumajes, obispillo y cola rojizos.

ESPECIES SIMILARES

El color oscuro del **macho** lo hace inconfundible entre las especies con cola roja. La **hembra, juvenil** y **macho** inmaduro pueden recordar a un **ruiseñor común**, que es de tamaño mayor, partes inferiores blancas y sin pluma oscura central en la cola; la hembra y juvenil de **colirrojo real** tienen el dorso pardo y partes inferiores ante.



Izquierda: cola de ruiseñor común; derecha 1º año de colirrojo real

SEXO

El **macho** adulto es negro con una mancha blanca en el ala. Las **hembra** adulta es de color pardo-gris, sin blanco en el ala. Los **juveniles** son similares a la hembra y no se pueden sexar. Después de su muda **postjuvenil**, algunos machos mantienen el plumaje similar al de la hembra por lo que esta especie no puede sexarse con seguridad hasta después de su primera muda **postnupcial**.

EDAD

Pueden reconocerse 3 tipos de edad:


Juveniles con aspecto similar al de las hembras, pero con plumaje nuevo.

1º año otoño/2º año primavera con contraste entre las plumas del ala mudadas, de color grisáceo, y las retenidas, más marrones; extremo del raquis de la pluma de la cola más externa negro en más de 9 mm, a veces con una mancha oscura en la barba externa de la pluma.

Adultos con las plumas del ala uniformes; extremo del raquis de la pluma de la cola más externa negro en menos de 8 mm, sin mancha oscura en la barba externa de la pluma.

MUDA

Muda **postnupcial** completa, que suele estar terminada entre finales de septiembre y primeros de octubre. La muda **postjuvenil** es parcial e incluye como mínimo las pequeñas coberturas y las dos grandes coberturas internas, si bien hay ejemplares que extienden su muda a todas las grandes coberturas y raramente terciarias y alguna secundaria. Suele estar terminada entre agosto y octubre, dependiendo del mes de nacimiento.



■ Todos los ejemplares
■ Algunos ejemplares


Colirrojo tizón. Extensión de la muda postjuvenil.

FENOLOGÍA

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII

ESTATUS EN ARAGÓN

Presente como reproductora en las áreas montañosas de la comunidad, donde es sedentaria exceptuando las cotas más altas. En invierno aparece de forma abundante en la depresión del Ebro, donde es rara como nidificante.



Colirrojo tizón. Detalle de la cola y el obispillo.


331 Colirrojo tizón



Colirrojo tizón. Verano. Adulto. Hembra (09-VII).




Colirrojo tizón. Verano. Juvenil (09-VII).





Colirrojo tizón. Verano. 2º año. Macho ().



Colirrojo tizón. Verano. Adulto. Diseño de la cabeza: arriba macho (09-VII); abajo hembra (09-VII).



Colirrojo tizón. Verano. 2º año. Hembra ().



Colirrojo tizón. Verano. Diseño de la cabeza: arriba 2º año macho (09-VII); centro 2º año hembra (); abajo juvenil (09-VII).



331 Colirrojo tizón



Colirrojo tizón. Verano. Adulto. Diseño del pecho: izquierda macho (09-VII); derecha hembra (09-VII).




Colirrojo tizón. Verano. Diseño del pecho: arriba izquierda 2º año macho (); arriba derecha 2º año hembra (); izquierda juvenil (09-VII).



Colirrojo tizón. Verano. 2º año. Diseño del dorso: arriba izquierda 2º año macho (); arriba derecha 2º año hembra (); izquierda juvenil (09-VII).



Colirrojo tizón. Verano. Adulto. Diseño del dorso: izquierda macho (09-VII); derecha hembra (09-VII).




Colirrojo tizón. Verano. Adulto. Desgaste de la cola y diseño de la pluma más externa: izquierda macho (09-VII); derecha hembra (09-VII).


331 Colirrojo tizón




Colirrojo tizón. Verano. Adulto. Hembra: diseño del ala (09-VII).




Colirrojo tizón. Verano. 2º año. Diseño de la cola: arriba izquierda 2º año macho (); arriba derecha 2º año hembra (); izquierda juvenil (09-VII).



Colirrojo tizón. Verano. 2º año. Macho: diseño del ala ().



Colirrojo tizón. Verano. Adulto. Macho: diseño del ala (09-VII).



Colirrojo tizón. Verano. 2º año. Hembra: diseño del ala ().

331 Colirrojo tizón



Colirrojo tizón. Verano. Juvenil: diseño del ala (16-VII).



Colirrojo tizón. Invierno. 1º año. Macho (18-XI).




Colirrojo tizón. Invierno. Adulto. Macho (18-XI).



Colirrojo tizón. Invierno. 1º año. Macho/hembra (18-XI).



Colirrojo tizón. Invierno. Adulto. Hembra (18-XI).




Colirrojo tizón. Invierno. Adulto. Diseño de la cabeza: arriba macho (18-XI); abajo hembra (18-XI).

331 Colirrojo tizón




Colirrojo tizón. Invierno. 1º año. Diseño de la cabeza: arriba macho (18-XI); abajo macho/hembra (18-XI).



Colirrojo tizón. Invierno. 1º año. Diseño del dorso: izquierda macho (18-XI); derecha macho/hembra (18-XI).





Colirrojo tizón. Invierno. Adulto. Diseño del pecho: izquierda macho (18-XI); derecha hembra (18-XI).



Colirrojo tizón. Invierno. 1º año. Diseño del pecho: izquierda macho (18-XI); derecha macho/hembra (18-XI).

Colirrojo tizón. Invierno. Adulto. Diseño de la pluma más externa de la cola: izquierda macho (18-XI); derecha hembra (18-XI).




Colirrojo tizón. Invierno. Adulto. Diseño del dorso: izquierda macho (18-XI); derecha hembra (18-XI).

Colirrojo tizón. Invierno. 1º año. Diseño de la pluma más externa de la cola: izquierda macho (18-XI); derecha macho/hembra (18-XI).

331 Colirrojo tizón



Colirrojo tizón. Invierno, Adulto. Macho: diseño de la cola (18-XI).



Colirrojo tizón. Invierno, 1º año. Macho/hembra: diseño de la cola (18-XI).



Colirrojo tizón. Invierno, Adulto. Hembra: diseño de la cola (18-XI).



Colirrojo tizón. Invierno, 1º año. Macho: diseño de la cola (18-XI).